

## CONGRESO IBEROAMERICANO DE EXTENSIÓN

TÍTULO: Atención de trastornos neurolingüísticos en el marco de la extensión asistencial en función docente

Autores: Ithurralde, Claudia; Röhner, Ma. Laura; Lenarduzzi, Tamara; De Rosa, Guillermina; Kainer, Valeria

Institución: Escuela de Fonoaudiología. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Rosario.

Mail de contacto: ithurralde@fmedic.unr.edu.ar

Palabras claves: extensión asistencial- docencia- afasias-

### Resumen

La pérdida de la comunicación resiente íntegramente a la persona; corresponde atender al trastorno del lenguaje para la futura reinserción familiar, social y laboral de quien lo padece.

La extensión asistencial en función docente de la cátedra “Alteraciones del Lenguaje en el Adulto” surge en el año 1995 sobre la base de concebir a la extensión como una función inherente a la universidad pública al servicio de la comunidad y se continúa. La misma intenta responder a la demanda de pacientes afásicos internados y externados períodos sub-agudo/ estado de la enfermedad respectivamente, a la vez que a la formación de alumnos - Carrera Licenciatura en Fonoaudiología- U.N.R.

Se busca que el alumno adquiera una comprensión básica de la realidad, sepa delimitar el trastorno del lenguaje, formular alternativas de solución al problema, integrando la formación científico-técnica con valores humanísticos y de ética profesional.

La intervención temprana en Sala (período sub-agudo) contempla el diagnóstico presuntivo del lenguaje y la concientización de la familia sobre la continuidad del tratamiento; la atención de pacientes externados (período de estado) se realiza con el dispositivo de Cámara Gesell (Consultorio Externo de la Escuela de Fonoaudiología). Se toma como unidades de análisis a 102 pacientes asistidos en sala y 20 pacientes en consultorio externo en el período: 1995-2009.

La población investigada en período subagudo muestra una prevalencia de trastornos neurolingüísticos en la franja etárea de 60-69 años (34/102) y en la correspondiente a 50-59 años (32/102). Hay un predominio de afasias en la población masculina (74/102) de etiología vascular (72/102).

Respecto de los pacientes en período de estado se observa un preeminencia de cuadros afásicos puros de severidad moderada (10/20), de los cuales 7/20 recaen en personas de sexo masculino.

Las conclusiones obtenidas referidas a edad, sexo y etiología se corresponden con lo postulado en la teoría.

